

**ZĀĻU APRAKSTS**  
**V/NRP/96/0456**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Cefa-Safe suspensija ievadīšanai tesmenī govīm

**2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS**

Katrs 10 ml injektors satur:

**Aktīvā viela:**

Cefapirīns (cefapirīna benzatīna formā) 300 mg

**Palīgviela(s):**

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

**3. ZĀĻU FORMA**

Suspensija uz eļļas bāzes ievadīšanai tesmenī

**4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA**

**4.1. Mērķa sugas**

Govis (ciestāves periodā)

**4.2. Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas**

Ievadīšanai tesmenī govīm ciestāves perioda sākumā subklīniskā mastīta ārstēšanai un mastīta profilaksei, kuru ierosina pret cefapirīnu jutīgas baktērijas.

**4.3. Kontrindikācijas**

Nelietot dzīvniekiem, kuri ir jutīgi pret cefalosporīniem.

**4.4. Īpaši brīdinājumi**

Nav

**4.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā**

**Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem**

Nav noteikti.

**Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai**

Personām, ar pastiprinātu jutību pret cefalosporīniem vajadzētu izvairīties no kontakta ar šīm veterinārajām zālēm.

**4.6. Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)**

Retos gadījumos tika novērotas alerģiskas reakcijas.

#### **4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas laikā**

Paredzēts lietošanai pēdējā grūsnības posmā.  
Nelietot laktācijas laikā.

#### **4.8. Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi**

Nelietot kombinācijā ar bakteriostatiskas darbības pretmikrobām veterinārām zālēm.

#### **4.9. Devas un lietošanas veids**

Pēc pēdējās slaukšanas reizes cietstāves perioda sākumā katrā tesmenā ievadīt viena injektora saturu.

#### **4.10. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams**

Nav piemērojama.

#### **4.11. Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā**

Gaļai un blakusproduktiem: 3 nedēļas.

Pienam: 2 slaukšanas reizes, ja govs atnesusies pēc vismaz 5 nedēļu cietstāves perioda; ja cietstāves periods īsāks kā 5 nedēļas, piens ir jātestē uz atliekvielām.

## **5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS**

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretmikrobu līdzekļi ievadīšanai tesmenī, cefapirīns, ATK vet kods: QJ15DA30

Cefapirīns ir cefalosporīnu  $\beta$ -laktāma grupas antitiotika. Tas ir pirmās paaudzes cefalosporīns, kurš darbojas pret daudziem grampozitīviem un dažiem gramnegatīviem organismiem. To neinaktivē penicilināzi producējošie stafilokoki.

## **6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA**

### **6.1. Palīgvielu saraksts**

Zemesriekstu eļļa  
Alumīnija tristearāts

### **6.2. Nesaderība**

Antagonismu starp cefalosporīniem un bakteriostatiskas darbības pretmikrobu līdzekļiem.

### **6.3. Derīguma termiņš**

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

### **6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

#### **6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs**

Zema blīvuma polietilēna injektori vienreizējai lietošanai, kas satur 10 ml. Injektori ir noslēgti ar uzgali. Kārbā 20 injektori un 20 tīrīšanas salvetes.

#### **6.5. Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārajām zālēm vai to atkritumiem, ja tādi ir**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

### **7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
P.O.Box. 35  
5830 AA Boxmeer  
Nīderlande

### **8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)**

V/NRP/960456

### **9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS**

21/10/2011

### **10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS**

10/2011

### **TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS**

Recepšu veterinārās zāles.