

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/99/1025**  
**Nobivac Lepto**  
ūdens suspensija injekcijām suņiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nīderlande

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Nobivac Lepto** ūdens suspensija injekcijām suņiem

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Katrs flakons ( 1 ml deva) satur:

**Aktīvās vielas:**

Inaktivēta *Leptospira interrogans* baktērija:

- serogrupa *Canicola*; serovariants *portland-vere*, celms Ca-12-000 800-1900 vienības/ml\*,
- serogrupa *Icterohaemorrhagiae*; serovariants *copenhageni*, celms 820K750-1500 vienības/ml\*,

\* Antigēna masas ELISA vienības, in vitro potence saskaņā ar Ph. Eur. monograph 0447.

**Palīgviela:**

Tiomersāls 0,1 mg.

**4. INDIKĀCIJAS**

Suņu aktīvai imunizācijai pret leptospirozi, kuru ierosina *Leptospira interrogans* serogrupas *Canicola* un *Icterohaemorrhagiae*.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nav.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Retos gadījumos var novērot vieglu, pārejošu pastiprinātas jutības reakciju.

Lokāla iekaisuma reakcija var parādīties pirmo dažu dienu laikā pēc vakcinācijas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

**7. MĒRĶA SUGAS**

Suņi.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES**

Subkutānai injekcijai pa 1 ml katram dzīvniekam.

Pamatvakcinācija:

Iepriekš nevakcinētus suņus jāvakcinē divas reizes ar 2-4 nedēļu intervālu. Primārā vakcinācija kucēniem jāuzsāk no 8 nedēļu vecuma.

Revakcinācija: reizi gadā (ar vienreizēju 1 ml devu katram dzīvniekam).

Ieteicams (re)vakcinēt pret leptospirozi pavasarī, jo inficēšanās ar *Leptospira* visbiežāk notiek vasarā, vasaras beigās, un suņiem, kuri bieži peldas dabiskās ūdenstilpnēs, ieteicams veikt atkārtotu vakcināciju 6 mēnešus pēc pamatvakcinācijas.

Nobivac dzīvās suņu vīrusa vakcīnas var tikt atšķaidītas ar Nobivac Lepto, ja tas ir nepieciešams.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Var lietot kopā ar: - Nobivac DHPPi;

- Nobivac DHP;

- Nobivac Puppy DP;

- Nobivac Rabies.

Nelietot maisījumā kopā ar citām veterinārajām zālēm.

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Pirms lietošanas ļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai (15-25°C).

Jālieto sterils injekciju aprīkojums.

Derīgs pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

Drīkst lietot dzīvniekiem grūsnības un laktācijas laikā.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2-8°C). Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Ja notikusi nejauša ievadīšana sev, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

## **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

04/2013

## **15. CITA INFORMĀCIJA**

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.