

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/96/0379

Nobivac RL suspensija injekcijām suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobivac RL suspensija injekcijām suņiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml devas satur:

Inaktivēts trakumsērgas vīrusa celms Pasteur RIV_{≥ 3 SV}.

Inaktivēta *Leptospira interrogans* serogrupa *Canicola*, celms CA-12-000, ≥ 40 kāmjū PD₈₀, un
Icterohaemorrhagiae, celms 820 K, 40 kāmjū PD₈₀.

Adjuvanti:

Alumīnija fosfāts

Palīgvielas:

Tiomersāls

4. INDIKĀCIJA(-S)

Suņu aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu un suņu leptospirozi, kuru ierosina *L. interrogans*
serogrupas *Canicola* un *Icterohaemorrhagiae*:

Imunitātes ilgums: pret trakumsērgu: 3 gadi,
pret leptospirozi: 1 gads.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc vakcinācijas reti var novērot vieglu pastiprināta jutības reakciju, kā tas ir iespējams pēc jebkuras
svešas olbaltumvielas ievadīšanas. Šāda tipa reakcijas vairumā gadījumu ir pašierobežojošas. Pirmās
dažas dienas pēc vakcinācijas var parādīties neliela izmēra lokāla reakcija.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Viena deva (1 ml) vakcīnas injicējot subkutāni.

Nobivac RL ir paredzēta suņiem no 8 nedēļu vecuma un vecākiem. Vakcīna, galvenokārt, tiek lietota,
kad suņiem ir nepieciešama trakumsērgas un leptospirozes vakcinācija vienā reizē.

Primārā vakcinācija pret trakumsērgu nevar tikt veikta līdz 12 nedēļu vecumam ar vienu ievadīšanu. Primārā vakcinācija var tikt veikta agrīnākā vecumā, bet tad atkārtota vakcinācija ir jāveic aptuveni 12 nedēļu vecumā, 2-4 nedēļas pēc pirmās vakcinācijas.

Primārā vakcinācija pret leptospirozi sastāv no divām ievadīšanām ar 2-4 nedēļu intervālu. Kucēniem ir jābūt vismaz 8 nedēļu veciem pirms tie saņem pirmo vakcināciju pret leptospirozi.

Tādējādi, Nobivac RL var tikt lietots šādiem mērķiem:

- **kucēniem (agrīnais sākums)**

8-9 nedēļu vecumā	Nobivac Lepto vai Nobivac RL (ja iespējama agrīna saskare ar trakumsērgu)
12 nedēļu vecumā	Nobivac RL (atkārtota vakcinācija ar trakumsērgu, lai nodrošinātu aizsardzību kucēniem ar maternālām antivielām).
- **primārā vakcinācija jebkurā vecumā \geq 12 nedēļām**

12 nedēļu vecumā	Nobivac RL
14-15 nedēļu vecumā	Nobivac Lepto

Revakcinācija

Revakcinācija pret trakumsērgu – ik pēc 3 gadiem. Revakcinācija pret leptospirozi ir jāveic katru gadu. Ieteicams [re]vakcinēt pret leptospirozi pavasarī, jo inficēšanās ar *Leptospirae* visbiežāk notiek [vēlīnā] vasarā, un suņiem, kuri bieži ir dabiskajās ūdenstilpnēs, veikt trešo vakcināciju pēc 6 mēnešiem pēc pamata vakcinācijas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai (15-25 °C).

Jālieto sterils injekciju aprīkojums.

Pirms lietošanas saskalināt.

Vakcinēt tikai klīniski veselus suņus. Pirms vakcinācijas suņi ir klīniski jāizmeklē. Ieteicams novērst kontaktu ar iespējamiem infekcijas avotiem 14 dienas pēc vakcinācijas.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav noteikts.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Sargāt no sasaldēšanas. Sargāt no gaismas.

Daudzdevu flakona saturs ir jāizlieto vienas darba dienas laikā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Vakcinēt tikai veselus suņus.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

05/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Tikai praktizējošam veterinārārstam.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.