

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/93/0040

Nobivac Rabies Ūdens suspensija injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, lapsām, seskiem, suņiem un kaķiem

1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobivac Rabies

Ūdens suspensija injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, lapsām, seskiem, suņiem un kaķiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra deva satur:

Aktīvā viela:

1 ml inaktivēts trakumsērgas vīrusa celms Pasteur RIV \geq 2 SV.

Palīgviela(s):

Tiomersāls 0,1 mg (0,01%)/

4. INDIKĀCIJAS

Veselu suņu, kaķu, liellopu, aitu, kazu, lapsu, sesku un zirgu un principā visu klīniski veselu zīdītājdzīvnieku aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc subkutānas ievadīšanas injekcijas vietā reti var novērot pārejošu iztaustāmu mezgliņu.

Retos gadījumos pēc ievadīšanas var novērot vispārīgas pastiprinātas jutības reakcijas. Šādā gadījumā var tikt indicēta subkutāna adrenalīna ievadīšana.

Ja novērojāt jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi, liellopi, aitas, kazas, lapsas, seski un zirgi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES

1ml vakcīnas intramuskulārai vai subkutānai injekcijai.

	Suņi/kaķi	Liellopi/zirgi	Aitas/kazas	Seski/lapsas
Primārā vakcinācija vecumā vai vecākiem	3 mēneši*	6 mēneši*	6 mēneši*	3 mēneši*
Revakcinē ik pēc	3 gadiem**	2 gadiem**	1 gada**	1 gada**
Ievadīšanas veids	i.m. vai s.c.	i.m.	i.m.	s.c.

*Primārā vakcinācija var tikt veikta agrīnākā vecumā, bet tad vakcināciju atkārtoti 3 vai 6 mēnešu vecumā, atkarībā no sugas.

** Spēkā esošie vietējie noteikumi var noteikt pieprasīt ātrāku revakcināciju.

Seroloģisko pētījumu rezultāti parāda, ka aitu, kazu un lapsu vakcinācija nodrošina aizsardzību ne mazāk kā vienu gadu.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai (15-25 °C).

Izmantot sterilas šļirces un adatas.

Pirms un lietošanas laikā labi saskalināt.

Suņiem: Nobivac Rabies var tikt lietots, lai izšķīdinātu liofilizētās Nobivac vakcīnas: Nobivac DHPPi, Nobivac DHP, Nobivac Puppy DPun kombinācijā ar Nobivac Lepto.

Kaķiem: Nobivac Rabies var tikt lietots, lai izšķīdinātu liofilizēto Nobivac Tricat vakcīnu.

Nesajaukt ar citu vakcīnu vai imunoloģisko produktu.

Drīkst lietot grūsnības laikā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Sargāt no sasaldēšanas. 10 devu iepakojumam, derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 24 stundas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

05/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.