

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/MRP/07/1709

**Nobivac Tricat Trio** liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai kaķiem

### 1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Intervet International B.V.  
Wim de Kórverstraat 35  
NL- 5831 AN Boxmeer

Zāļu sērijas ražotājs:

Intervet International B.V.  
Wim de Kórverstraat 35  
NL- 5831 AN Boxmeer

### 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Nobivac Tricat Trio** liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai kaķiem

### 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viena deva 1 ml satur:

Liofilizāts:

**Aktīvās vielas:**

- dzīvs, novājināts kaķu kalici vīruss, celms F9:  $\geq 4,6 \log_{10}$  PFU<sup>1</sup>;
- dzīvs, novājināts kaķu herpes vīruss, 1.tipa, celms G2620A:  $\geq 5,2 \log_{10}$  PFU<sup>1</sup>;
- dzīvs, novājināts kaķu panleikopēnijas vīruss, celms MW-1:  $\geq 4,3 \log_{10}$  CCID<sub>50</sub><sup>2</sup>.

<sup>1</sup>PFU: iekaisuma plankumu veidojošās vienības (Plaque-Forming Units).

<sup>2</sup>CCID<sub>50</sub>: 50% inficējošā deva šūnu kultūrā (Cell Culture Infective Dose 50%).

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai.

Pelēkbalts liofilizāts

### 4. INDIKĀCIJAS

Kaķu aktīvai imunizācijai, sākot no 8-9 nedēļu vecuma, lai samazinātu klīniskās pazīmes, ko izraisa inficēšanās ar kaķu kalici vīrusu (FCV) un kaķu herpes 1.tipa vīrusu (FHV, kaķu rinotraheīta vīruss) un novērstu klīniskās pazīmes, vīrusa izdalīšanos un leikopēniju, ko izraisa kaķu panleikopēnijas vīruss (FPLV).

Imunitāte iestājas pret FCV un FHV pēc 4 nedēļām un pret FPLV pēc 3 nedēļām.

Imunitātes ilgums ir 1 gads pret FCV un FHV un 3 gadi pret FPLV.

### 5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot grūsnības vai laktācijas laikā, jo vakcīna nav pārbaudīta grūsnām vai laktējošām kaķenēm. Dzīvs FLP vīruss var izraisīt reproduktīvas problēmas grūsnām kaķenēm un dzimšanas defektus pēcnācējiem.

### 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Injekcijas vietā 1-2 dienas var novērot nedaudz sāpīgu pietūkumu. Nelielu, pārejošu ķermeņa temperatūras paaugstināšanos (līdz 40°C) var novērot 1-2 dienas pēc vakcinācijas. Dažos gadījumos līdz 2 dienām pēc vakcinācijas var novērot šķaudīšanu, klepošanu, izdalījumus no deguna un nelielu kūtumu un samazinātu apetīti. Ļoti retos gadījumos vakcīna var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (nieze, aizdusa, vemšana, caureja un kolapss).

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Kaķi

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA**

Ne mazāk kā 4,6 log<sub>10</sub> PFU FCV, celms F9, 5,2 log<sub>10</sub> PFU FVR, celms G2620A un 4,3 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub> FPLV, celms MW-1, 1,0 ml šķīdinātāja.

Primārai vakcinācijai ir nepieciešamas divas devas, ko injicē subkutāni ar 3-4 nedēļu intervālu. Pirmo devu injicē sākot no 8-9 nedēļu vecuma un otru devu sākot no 12 nedēļu vecuma.

### Revakcinācija:

Viena deva (1 ml) saskaņā ar sekojošu grafiku:

Revakcinācijai pret kaķu kalici vīrusu un kaķu herpes 1.tipa vīrusu jāveic katru gadu (ar Nobivac Ducat vai citām vakcīnām, kas satur F9 un G2620 celmus, kur pieejamas).

Revakcināciju pret kaķu panleikopēnijas vīrusu jāveic ik pēc trīs gadiem (ar celmu MW-1 kā ir Nobivac Tricat Trio, kur pieejams).

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Pirms pašas lietošanas izšķīdināt liofilizēto vakcīnas frakciju klātpievienotajā šķīdinātājā. Injicēt šķīdinātāju flakonā, kas satur liofilizēto granulu un uzmanīgi saskalināt līdz pilnīgai izšķīdināšanai. Ļaut vakcīnai sasniegt istabas temperatūru un ievadīt ar subkutānu injekciju 1 ml vakcīnas. Lietot sterilu injekciju aprīkojumu, bet nepieļaut vakcīnas nonākšanu saskarsmē ar dezinfekcijas līdzekli. Izšķīdināta vakcīna jāizlieto 30 minūšu laikā.

## **10. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Liofilizāts: Uzglabāt temperatūrā 2°-8°C.

Sargāt no gaismas.

Šķīdinātājs: Drīkst uzglabāt temperatūrā līdz 25°C, ja uzglabā atsevišķi no liofilizāta.

Nesasaldēt.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

## **11. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Mātes antivielas, kuras izdalās līdz 9-12 nedēļu vecumam, var negatīvi ietekmēt vakcinācijas efektivitāti. Mātes antivielu klātbūtnē vakcinācija nevar pilnīgi novērst klīniskās pazīmes, leikopēniju un vīrusa izdalīšanos pēc inficēšanās ar FPLV. Šādos gadījumos, kad ir gaidāms augsts no mātes iegūto antivielu līmenis, vakcinācijas grafiks ir atbilstoši jāplāno.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem izvērtējot katru gadījumu atsevišķi

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Desmitkārtējas pārdozēšanas gadījumā injekcijas vietā 4-10 dienas var novērot nedaudz sāpīgu pietūkumu.

1-2 dienas var novērot nelielu pārejošu ķermeņa temperatūras paaugstināšanos (līdz 40,8°C).

Dažos gadījumos pāris dienas pēc vakcinācijas var novērot vispārēju diskomfortu, klepošanu, šķaudīšanu, pārejošu letarģiju un samazinātu apetīti.

Nesajaukt kopā ar citām veterinārām zālēm.

## **12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

## **13. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

02/2014

## **14. CITA INFORMĀCIJA**

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Iepakojuma izmēri: 5x, 10x, 25x, 50x 1 vakcīnas un šķīdinātāja deva

Ne visi iepakojuma veidi (izmēri) var tikt izplatīti.