

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/MRP/13/0059**

Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm kakla sikсна maza un vidēja auguma suņiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

vai

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm kakla sikсна maza un vidēja auguma suņiem
Deltamethrin

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena balta 48 cm gara kakla sikсна satur:

Aktīvā viela:

Deltametrīns 0,760g

Palīgviela:

Titāna dioksīds (E171) 0,285g

4. INDIKĀCIJA(-S)

Ērču (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) invāzijas kontrolei 5 - 6 mēnešus ilgi.
Asins sūcēju kukaiņu (*Phlebotomus perniciosus*) kontrolei 5 - 6 mēnešu periodā.
Novērš pieaugušu *Culex pipiens* sugas moskītu barošanas līdz 6 mēnešiem ilgi.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot kucēniem jaunākiem par 7 nedēļām.
Nelietot suņiem ar ādas bojājumiem.
Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta pastiprināta jutība pret piretrīniem.
Nelietot kaķiem.



NELIETOT KAĶIEM.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Reti tika novērotas lokālas ādas reakcijas (nieze, apsārtums, apmatojuma zudums) kakla rajonā vai uz visas ādas, kas var norādīt uz lokālu vai vispārēju pastiprinātas jutības reakciju.

Ļoti reti ir ziņots par izmainītu uzvedību (piemēram, letarģiju vai hiperaktivitāti), kas bieži saistīta ar ādas kairinājumu.

Loti retos gadījumos tika novēroti gastroenterāli simptomi, piemēram, vemšana, caureja un pastiprināta siekalošanās.

Ļoti reti tika novērotas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, ataksija un muskuļu trīsas.

Šie simptomi parasti izzūd 48 stundu laikā pēc kakla siksnas noņemšanas. Ārstēšanai jābūt simptomātiskai, jo specifisks antidots nav zināms.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums jānorāda sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā),
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem),
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1,000 dzīvniekiem),
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10,000 dzīvniekiem),
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

48 cm garā kakla sikсна jālieto maza un vidēja auguma suņiem.


Uzlikšanai ap kaklu.

Viena kakla sikсна paredzēta vienam sunim.

Tikai ārīgai lietošanai.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Izņemiet kakla siksnu no slēgtās aizsarg paciņas. Noregulējiet kakla siksnu ap dzīvnieka kaklu, nepievelkot to pārāk cieši. Starp kakla siksnu un suņa kaklu jāietilpst diviem blakus saliktiem pirkstiem. Izveriet siksnas galu caur sprādzi un nogrieziet lieko garumu, kas pārsniedz 5 cm.



10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Kakla siksna noslēgtā folijas paciņā jāuzglabā ārējā kartona iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz kartona iepakojuma un paciņas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Tā kā kakla siksna sasniedz maksimālo iedarbību pēc vienas nedēļas, kakla siksnu ieteicams uzlikt 1 nedēļu pirms dzīvnieki varētu būt pakļauti invāzijas riskam.

Nēsājot kakla siksnu, ļoti retos gadījumos var novērot ērcu piestiprināšanos, tāpēc nelabvēlīgos apstākļos nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnesanu ar ērcēm vai moskītiem.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Ādas bojājumu gadījumā noņem kakla siksnu līdz simptomu izzušanai.

Mazgāšanas ietekme uz zāļu iedarbības ilgumu nav pētīta.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc kakla siksņas uzlikšanas mazgāt rokas ar ziepēm un aukstu ūdeni.

Personām ar pastiprinātu jutību pret kakla siksņas sastāvdaļām vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Neļaujiet bērniem, jo īpaši jaunākiem par 2 gadiem, pieskarties kakla siksnei, spēlēties ar to vai ielikt to savā mutē.

Jāuzmanās, lai nepieļautu mazu bērnu ilgstošu intensīvu saskari, piemēram, gulēšanu, ar dzīvnieku, kuram uzlikta kakla siksna.

Glabāt paciņu ar kakla siksnu ārējā kartona iepakojumā līdz lietošanai.

Neskatoties uz to, ka neregulāra saskare ar ūdeni nesamazina kakla siksņas efektivitāti, tā vienmēr jānoņem pirms suņa peldināšanas un mazgāšanas, jo aktīvā viela ir bīstama zivīm un citiem ūdenī dzīvojošiem organismiem. Suņiem jāizvairās no peldēšanās ūdenī pirmās piecas dienas pēc kakla siksņas uzlikšanas.

Grūsnība:

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Laktācija:

Drīkst lietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot kopā ar citiem ektoparazitīdiem līdzekļiem, kas satur organofosfātus.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ja tomēr gadās, ka suns ir graužis kakla siksnu, var parādīties sekojoši simptomi: nekoordinētas kustības, trīce, siekalošanās, vemšana, stīvums pakalķājās.

Šie simptomi parasti izzūd 48 stundu laikā.

Ja nepieciešams, simptomātiskai ārstēšanai var lietot diazepamū.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Šīs veterinārās zāles ir bīstamas zivīm, citiem ūdenī dzīvojošiem organismiem un bitēm. Zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

2804/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.